


مدیریت آفات کتان

Flax pest management

ضابور مهدی علمدارلو

Alamdarlou.r@arc-orde.ir

کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی

نحوه مبارزه با آفت						مرحله رشدی کتان
	دانه بندی	گلدهی	رشد رویشی	گیاهچه	کوتیلدونی	آفت
تناوب، شخم عمیق و یخ آب زمستانه، استفاده از طعمه مسموم (مخلوط حشره کش و سبوس گندم) و یا سمپاشی با سم دورسبان در انتهای روز.				<i>Agrotis spp</i>		لارو طوقه‌بر
تناوب، کشت به موقع، آماده نمودن بسترکشت مناسب، تیمار بذر و سمپاشی با سموم مناسب				<i>Aphthona euphorbiae</i>		کک نباتی
کشت به موقع، آبیاری متعادل، کنترل آفت در صورت نیاز با یکی از سموم فسفره و یا ایمیداکلوپراید (کنفیدور)				<i>Thrips linarius</i>		تریس کتان
تناوب، کنترل علفهای هرز، کنترل آفت با سموم پریمیکارپ (پریمور)، ایمیداکلوپراید (کنفیدور).				<i>Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae</i>		شته
تنظیم تاریخ کشت، مدیریت و کنترل علف های هرز، سمپاشی با سموم دسیس، دیازینون یا کنفیدور در صورت نیاز.				<i>Lygus spp</i>		سن‌ها
شخم عمیق، مدیریت بقایا، کشت به موقع، در صورت نیاز سمپاشی با سموم دورسبان یا مالاتیون.				<i>Dasineura lini</i>		مگس گالزا
کشت به موقع، مبارزه با علف های هرز، ارقام متحمل، کنترل آفت در صورت نیاز با ایمیداکلوپراید (کنفیدور) یا آبامکتین (ورتی‌مک)				<i>Phytopmyza horticola</i>		مینوز برگ
تناوب، شخم عمیق و یخ آب زمستانه، کنترل علف‌های هرز، کنترل آفت در مراحل اولیه لاروی با استفاده از سموم تیودیکارپ (لاروین)، ایندوکساکارب (آوانت) و...				<i>Spodoptera spp</i>		لاروهای برگ‌خوار