



کامبیز فروزان

Kforoozan@ordc.ir

قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

دفتر مرکزی شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی

پرورش کتان - تولید و مدیریت (قسمت ۱۱)

Flaxseed-production and management (part eleven)

	چه کاری باید انجام دهیم		به دنبال چه هستیم
	مرحله شاخه‌بندی - ظهور جوانه و شروع گلدهی	در حال حاضر	در دوره بعدی کشت
		از ارقام مقاوم به خوابیدگی استفاده کنید. -مقدار بذر توصیه شده را متناسب با نوع خاک و شرایط رطوبتی مصرف نمایید. -آزمایش خاک را انجام داده و کود شیمیایی را متناسب با عملکرد هدف مصرف کنید.	خوابیدگی -مقدار بذر مصرفی بیش از اندازه و تعدد تعداد بوته -مصرف بیش از اندازه نیتروژن
		-تناوب زراعی مناسب را به کار ببرید -از تیمارهای توصیه شده بذری استفاده کنید. - از کشت بقولات و چغندرقد به عنوان زراعت قبلی خودداری نمایید.	پوسیدگی ریشه
		-از بذور گواهی شده بدون بیماری استفاده کنید. - از تیمارهای توصیه شده برای بذور استفاده کنید. -تناوب زراعی توصیه شده رعایت شود.	شکستگی ساقه
		آزمون خاک و افزودن موادغذایی برای ایجاد تعادل تغذیه‌ای بررسی تناوب زراعی در خاک مزرعه بررسی تناوب زراعی در خاک‌های منطقه کشت ارقام مقاوم به کلروزسیس	کاهش گلدهی و عدم وجود گل -خسارت سوسک <i>Lygus</i> به اندام‌های رشدی گیاه -از بین رفتن جوانه مرکزی به دلیل وجود آهک زیاد در خاک -خاک مرطوب یا اشباع -کلروزسیس
		-بهبود زهکش سطحی خاک	گلدهی از قسمت پایینی ساقه شاخه -خاک‌های مرطوب یا اشباع -تراکم پایین بوته
		-بررسی تناوب زراعی برای خاک‌های منطقه -مصرف مقادیر توصیه شده بذر بر پایه شرایط منطقه	